

1887
Kans Medical Library
Aus dem anatomischen Institut zu Breslau.

as vordere Ende der Chorda dorsalis und
der Franck'sche Nasenkamm.

Inaugural-Dissertation,

welche

nebst beigefügten Thesen

mit Genehmigung

der medicinischen Facultät der Universität Breslau

zur Erlangung der Doctorwürde

in der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe

am Abend, den 30. Juli 1887, Mittags 12 $\frac{1}{2}$ Uhr,

in der Aula Leopoldina

öffentlich verteidigen wird

Otto Paulisch

aus Reichthal.

Opponenten:

med. H. Born, Assistenzarzt an der Kgl. Frauenklinik zu Breslau.

med. C. Schlüter.

med. C. Heintze.

BRESLAU.

Druck von Anton Schreiber, Breslau, Albrechtsstrasse 20.

Zum Druck genehmigt auf Antrag des Referenten
Herrn Professor Dr. C. Hasse.

Seinem hochverehrten Lehrer

Herrn Professor Dr. C. Hasse

Direktor des anatomischen Instituts der Universität Breslau

in tiefster Hochachtung

sowie

Seinem väterlichen Freunde

herrn Regierungs- u. Medicinalrat

Dr. Dieterich

zu Stettin

in aufrichtiger Dankbarkeit

gewidmet

vom Verfasser.

Eine ausführliche Darstellung meiner Untersuchungen
Hinzufügung von Abbildungen wird in nächster Zeit im
Archiv für Anatomie und Physiologie“ erscheinen.

In seinem „Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des
Menschen und der höheren Säugetiere“ vertritt v. Kolliker
die Ansicht, dass die Chorda dorsalis nach vollkommener
Entwicklung des Schädels nie bis an das vordere Schädelende
reicht, sondern da aufhöre, wo am erwachsenen Tiere die
erste Sattellehne sich befindet. Da diese Lehre fast all-
gemein anerkannt war, so erschien es um so wunderbarer,
als Herr Prof. Albrecht in der „Société d'anatomie patho-
logique de Bruxelles“ eine Entdeckung veröffentlichte, welche
die Ansicht von Kollikers vollständig verwarf. In seiner
Mitteilung, die unter dem Titel „Sur les spondylocentres
artificiels du crâne, la non-existence de la poche de Rathke
et la présence de la chorde dorsale et de spondylocentres
dans le cartilage de la cloison du nez des vertébrés“ später
im Druck erschien, heisst es:

„Le basiethmoïde et le basirhinoïde sont des complexes
de centres de vertèbres, qui ont été traversés originairement
par la chorde dorsale. Il s'agit dans ce cas d'un crâne de
type normal adulte qui présente la chorde dorsale dans
sa longueur (i. e. 15½ centimètres) de la cloison du nez

et qui demontre en plus sept centres de vertèbres ossifiées rangés metamériquement dans le sens caudo-crânial.“ „ne reste plus de doute sur l'explication de la figure 300 pg. 509 de la 2^{me} édition de l'ontogenie de l'homme et des animaux supérieurs de M. v. Koelliker. L'erreur fondamentale commise par ce savant est qu'il admet que *ch* est cette figure qui touche à l'ectoderme et retrohypophysie. En même temps il est clair que tout espace entre *ms* d'un côté et *ch* et *h* d'autre côté comprend la partie sphénoethmoidale du crâne.“

Ferner behauptet er in derselben Schrift: „que la division de l'hypophyse dans un lobe antérieur et postérieur est artificielle et n'a aucun droit embryologique.“

Bald darauf fordert Koelliker Albrecht auf¹⁾, den fraglichen Ochschädel, der in der ganzen Länge das Septum narium die Chorda dorsalis enthalten solle, einem kompetenten Embryologen, entweder Lieberkühn oder Hensen oder His zur Ansicht zu senden. „Kommt Albrecht dieser Aufforderung nicht nach, so werden die Fachgenossen wissen, wie es mit der Begründung der Hypothesen dieses Forschers steht.“ Aber Albrecht konnte dieser Aufforderung nicht nachkommen. Prof. Wehenkel nämlich, in dessen Sammlung der rätselhafte Ochschädel war, gestattete nicht, dass derselbe sein Institut verlasse.

Dagegen fügt er in seiner Erwiderung²⁾ die ganze Geschichte und einen genauen Status praesens dieses Septalesstranges bei, dessen Inhalt ich kurz erwähnen will.

Als Anamnese seines Gebildes hebt Albrecht zunächst hervor, dass er schon vorher, ehe er das Brüsseler Präparat kannte, der Ansicht gewesen sei, die Chorda dorsalis gehe bis zum

¹⁾ Biolog. Centralblatt. V. Band. No. 1, 15. Febr. 1885.

²⁾ Biolog. Centralblatt. V. Band. No. 5 u. 6, 22. April 1885.

anderen Ende des Septum narium, und dass er schon vorher Versuche gemacht habe, Ueberreste derselben in diesem Gebiet zu entdecken, der oben erwähnte Rindskopf sei nur der erste Beweis für seine Theorie gewesen. Dann folgt als Status praesens die genaue makroskopische und mikroskopische Untersuchung des Stranges, soweit es die Liberalität von Hof. Wehenkel gestattete.

Der Schädel, der trocken konservirt war, sei der eines erwachsenen Rindes, die Nähte weit in der Synostose vorschritten. Im knorplichen Septum selbst befinde sich der eigentümliche Strang, sowohl links als rechts; er beginne 1 mm vor der vordersten Spitze der Lamina perpendicularis ossis ethmoidalis und ende an der Haut der Nase. Er trage ferner sieben höchst eigentümliche unter der Schleimhaut stehende Hervorragungen, welche teilweise den Strang um ein beträchtliches überragen. Bei durchfallendem Licht setze sich der Strang scharf gegen das sonst transparente knorpliche Septum ab, indem er völlig schwarz und undurchsichtig erscheine. Mikroskopisch bestehen die Hervorragungen aus spongiossem Knochen, der von einer stark blutgefässhaltigen Schleimhaut überzogen sei. Zwischen dem Knochen und der Schleimhaut befinde sich keine Spur von hyalinem Knorpel. Zwischen den einzelnen Ossifikationspunkten zeige der Strang strukturelles Bindegewebe, das parallel der Längsaxe des Stranges verlaufe.

Es folgt dann die Diagnose, in der alle Möglichkeiten abzuwogen werden, was der Strang darstellen könne.

Eine pathologische Bedeutung erkennt Albrecht zunächst nicht an, auch eine senile Verknöcherung hält er für ausgeschlossen, dagegen versucht er ihn morphologisch zu erklären und kommt schliesslich zu dem Schlusse, dass diese Ossifikationspunkte Wirbelcentren seien und dass der zwischen

den Ossifikationspunkten gelegene Strang „nichts anderes sein kann als die Chorda dorsalis, die sich durch einen Zufall erhalten und zu einem fibrillären Strang ausgebildet hat.“ „Dass man Sphenoidale anterius, Lamina perpendicularis des Siebbeins und Septum narium cartilagineum als das vordere Ende der Wirbelkörpersäule des Schädels ansehen könne, habe von Kolliker selbst gelehrt, warum sträubt sich Kolliker so gegen seine Angaben, die doch die ursprünglich nur als Theorie bestehende Lehre zur Thatsache mache? Die metameren Ossifikationen sind eben die vordersten Schädelwirbelcentra und der zwischen ihnen liegende Strang die Chorda.“ Eine vollständige Identität mit dem Franckschen Nasenkamm erkennt Albrecht noch nicht an, da der von ihm beschriebene Strang 14 mm vor der Lamina perpendicularis des Siebbeins beginne, während der Francksche Kamm bereits an der Lamina perpendicular. seinen Anfang nehme.

Analog dem Strange sei in der schon oben genannten Kolliker'schen Figur (Fig. 308 pg. 509 2. Auflage der Entwicklungsgeschichte) die Strecke zwischen *ms* u. *ch*, d. h. diese Strecke stelle den sphenothmoidalen Teil des Schädels dar. Schliesslich erklärt Albrecht, dass er betreffs der Entwicklung der Hypophysis nur das gelegnet habe, was Rathke selbst gelegnet hat.¹⁾ „Denn Rathke hat bereits 1847 alles, was er über die Entstehung der Hypophysis aus der nach ihm benannten Tasche in früheren Jahren veröffentlicht hat, für falsch erklärt.“

Bald darauf erschien unter dem Titel „Herr Paul Albrecht zum letzten Male“²⁾ eine Antwort Kollikers, in

¹⁾ Rathke, Ueber die Entwicklung der Schildkröten. Braunschweig 1848. Pg. 29.

²⁾ „Herr Paul Albrecht zum letzten Male.“ Sitzungsberichte der Würzburger Phys. med. Gesellschaft, 12. August 1885.

Welcher dieser erklärt, „dass der von Albrecht im septum
trium gefundene Bindegewebsstrang keine Chorda ist und
einziges Attribut derselben besitzt, und dass somit auch
die Bezeichnung der Ossifikationen um diesen Strang als
Wirbelkörper eine willkürliche ist.“

Im nächsten Jahr unternahm es unter Bonnet's Leitung
Herr Neuner¹⁾ das Streitmaterial noch einmal zu sichten und
den Streit zu einem möglichst befriedigenden Abschluss zu
führen und er kam dabei zu folgenden für uns wesentlichen
Resultaten:

„Der Strang, den Albrecht in der Nasenscheidewand
des alten Rinderschädels gefunden hat, ist nichts anderes
als eine konstante und normale Bildung, nämlich der in mor-
phologischer Hinsicht noch völlig unklare Nasenkamm.“

Die nach Albrecht „metameren“ Ossifikationscentra sitzen
am knorpeligen Nasenseptum und sind Produkte eines senilen
Verknochnungsprozesses, da sie sich nur bei alten Rindern finden.

Das vordere Cordaende findet sich entsprechend der An-
gabe der Autoren in der Gegend des Türkensattels, vor-
welchem nicht die leiseste Spur einer chordaähnlichen Bildung
gefunden werden konnte.“

Keineswegs aber vermochten alle diese Untersuchungen
Herrn Professor Dr. Albrecht zu überzeugen, er hatte immer
noch die scheinbare Bestätigung seiner Ansichten in der
Müller'schen Figur und in dem Befund an dem Brüsseler
Schädel, und es erschien darauf im zweiten Heft seiner
anatomischen Untersuchungen²⁾ noch einmal eine genaue Be-
leuchtung des Themas, in der er nicht nur seine früheren

¹⁾ Inaugural-Dissertation. München 1886. Druck von J. B. Hirsch-
J. Leipzig.

²⁾ Vergleichend. anatom. Untersuchungen v. Paul Albrecht, Dr. med.
Hilf., Kgl. preuss. Professor. Hamburg. P. Albrecht's Selbstverlag. 1886.

Theorien über Chordaresten und Wirbelcentren im Schädelgerüst aufrecht erhält, sondern auch noch neue Beobachtungen anführt, nach welchen längs des unteren Vomerrandes Überreste von Hypapophysen auftreten sollen.

Als einzigen embryologischen Beweis führt er auch hier wieder die Kolliker'sche Figur an, und an ihr versucht er klarzulegen, „dass die primitive und definitive Sattellehne in jedem Stadium der Entwicklung an demselben genau morphologisch gekennzeichneten Orte liegen“, und dass der Teil der Chordader an der Kolliker'schen Figur vor der primitiven Sattellehne (*ms*) liege, auch vor der definitiven Sattellehne liege, den speno-ethmoidalen Teil des Schädels bilden helfe und noch im Septum narium sich nachweisen lasse.

Es würde zu weit führen, an dieser Stelle eine genauere Darstellung der Beweisführung Albrechts zu geben, die Ansichten Neuners erkennt er durchaus nicht an, stellt ihnen immer wieder seine eigenen anfänglichen Ansichten gegenüber, und schliesslich macht er „den ersten Versuch, eine wirkliche unumstössliche Grundlage für die Wirbeltheorie des Schädels zu schaffen“.

Die Bedeutung des Franck'schen Nasenkammes zu schildern, der ja die Ursache des ganzen Albrecht-Kolliker'schen Streites ist, und den Neuner als „morphologisch unklar“ bezeichnet hatte, war der eigentliche Zweck dieser Arbeit. Diese Erklärung wird aber erst dann auf eine gewisse Vollständigkeit Anspruch machen dürfen, wenn die Ansichten, die Albrecht bisher über die Bedeutung des Nasenkammes veröffentlicht hat, widerlegt worden sind.

Wir wollen daher im ersten Teil unserer Arbeit die Unhaltbarkeit der Albrecht'schen Anschauungen darlegen und erst im folgenden Teil näher auf den Nasenkamm selbst eingehen.

Drei Behauptungen sind es, die Albrecht in seinen diese Streitfrage berührenden Schriften aufgestellt und energisch verteidigt hat:

1. Primitive und definitive Sattellehne liegen an demselben morphologisch genau gekennzeichneten Orte (*ms* der Kölliker'schen Figur).

2. In der Nasenscheidewand des Rindes befinden sich die rudimentärsten der Chorda dorsalis und Wirbelcentrenkomplexe. Le basiethmoïde et le basirhinoïde sont des complexes de centres de vertèbres qui ont été traversés originairement par la corde dorsale.“

3. Die Rathkesche Tasche existiert nicht im Sinne der Forscher, die bisher darüber Untersuchungen angestellt haben. Que l'hypophyse est en un mot embryologiquement et morphologiquement tout à fait hors connexe et indépendant du cerveau et du pharynx et de la cavité orale primitive. Jamais il ne se détache du crâniopharynx, jamais il ne devient le lobe antérieur de l'hypophyse. Le soi-disant épithéliums qu'on a trouvés dans les tuyaux de l'hypophyse sont des épithéliums.“)

Fragen wir zunächst, welche Beweise Albrecht für seine Hypothesen anführt, so bestehen diese, abgesehen von dem Fundament an dem Brüsseler Rinderschädel, nur in seiner Auslegung der schon oben erwähnten Kölliker'schen Figur.

Ihnen gegenüber stehen zahlreiche Befunde anderer Autoren, welche fast sämtlich auf genauen anatomischen und embryologischen Untersuchungen basieren.

Was die Meinung Albrechts anlangt, dass die primitive und definitive Sattellehne an demselben Orte liegen sollen, hat schon Prof. Rabe-Rückhard¹⁾ versucht, sie zu wider-

¹⁾ Anatom. Anzeiger, 15. Sept. 1886.

legen, indem er es „für eine nicht bestreitbare Thatsache hielt, dass Albrecht sich in Betreff der Identifizierung der primitiven und definitiven Sattellehne eines augenfälligen Irrtums schuldig gemacht hat.“

Ferner bestehen viele Angaben von Autoren, welche alle durch die verschiedenartigsten Beobachtungsweisen, insbesondere durch Untersuchungen an Medianschnitten von Embryonen höherer Wirbeltiere in den mannigfaltigsten Entwicklungsstadien, zu der Ueberzeugung gelangt sind, dass die Chorda dorsalis nie (*nb* im entwickelten Organismus) bis an das craniale Schädelende reiche, sondern stets in der Gegend der Sella turcica ende.¹⁾

Ebenso ist man durch exakte embryologische Untersuchungen zu der Annahme gelangt, dass die Hypophysis entwicklungsgeschichtlich in einen vorderen und hinteren Lappen zu trennen sei und dass der vordere seine Entstehung der primitiven Mundhöhle, des hintere dem Centralnervensystem verdanke.²⁾

Albrecht kennt alle diese Befunde recht genau, er führt sie zum grössten Teil in seinen Abhandlungen an,¹⁾ und doch wagt er es, ihnen seine ganz abweichenden Behauptungen entgegenzustellen. Er könnte dies unmöglich thun, wenn er nicht der Ansicht wäre, dass die Art seiner Beweisführung unanfechtbar ist.

¹⁾ v. Kölliker, „Herr Paul Albrecht zum letzten Male.“ Sitzungsberichte der Würzburger Phys.-Med. Gesellschaft. 1885. pg. 2 (Sept.-A.) Bonnet-Neuner, Inaugural-Dissertation.

Rabl-Rückhard, Zur Albrecht-Koellikerschen Streitfrage. Anatom Anzeiger, 15 Sept. 1886, pg. 202.

Romiti, Sopra la estremita anteriore della chorda dorsale. Siena, Torrini 1885.

²⁾ v. Mihalcowics, Wirbelsaite und Wirbelanhang. Archiv für mikroskop. Anatomie. Band XI pg. 389 u. ff.

Eine etwas genauere Betrachtung seiner Beweismittel wird bald lehren, dass sie alle unhaltbar sind und dass die Schlüsse, denen er durch sie veranlasst wurde, Trugschlüsse sind.

Von keinem der früheren Gegner Albrechts ist die Beweisführung dieses Autors direkt angegriffen und als unzulänglich hingestellt worden. Es ist ihnen aus diesem Grunde nicht gelungen, Albrecht von der Unrichtigkeit seiner Behauptungen zu überzeugen.

Ich habe mir es aber zur Aufgabe gemacht, grade auf besonders zu achten und habe versucht auf den Ideenweg Albrechts einzugehen, und auf diese Weise allein wird es möglich sein, Herrn Prof. Albrecht zu zeigen, wie fehlerhaft seine Schlussfolgerungen sind, und wie unhaltbar die von ihm seinem Ausspruch „wirklich unumstössliche Grundlage für die Wirbeltheorie des Schädels“ ist!

Ich habe mich deshalb der Mühe unterzogen, eine Reihe von Kaninchenembryonen in Medianschnitte zu zerlegen von dem Stadium an, das in der Kölliker'schen Zeichnung abgebildet ist, bis zu einem Stadium, wo die Ausgestaltung des knorplichen Schädelgerüsts und besonders der Sphenellehne und Sattelgrube beendet ist.

Leider muss ich mir es versagen, an dieser Stelle auf den einzelnen Fehler, den die Beweisführung Albrechts in sich schliesst, an der Hand von embryologischen Figuren aufmerksam zu machen, ich kann nur auf die ausführliche Darstellung meiner Beobachtungen hinweisen, die demnächst in „Archiv für Anatomie und Physiologie“ veröffentlicht werden wird, und welcher eine Reihe embryologischer Zeichnungen beigelegt sind. Ich will hier die Folgerungen erwähnen, zu denen ich durch verschiedenartige embryologische Untersuchungen gelangt bin und die mit den Ansichten Albrechts in direktem Gegensatz stehen.

1) Die primitive und die definitive Sattellehne sind an morphologisch ganz verschiedenen Punkten gelagert.

ms der Köllikerschen Figur ist in der That der Ort der primitiven Sattellehne, er liegt in diesem Embryonalstadium da, wo das Mittelhirn anfängt und das Zwischenhirn aufhört.

Wenn aber Herr Albrecht der Ansicht ist, dass *ms* auch in jedem späteren Stadium der Entwicklung des Tieres an derselben Stelle liegt, d. h. zwischen den basalen Teilen des Mittelhirns und Zwischenhirns, so spricht er damit eine Behauptung aus, die gegen die Grundlehren der Entwicklungsgeschichte verstösst. Bekanntlich ändern sich im weiteren Verlauf der Entwicklung die gegenseitigen Lagerungsverhältnisse der Organe ganz erheblich und auch in unserem speziellen Fall die gegenseitigen Beziehungen zwischen Schädelinhalt und Schädelbasis. Der Schädelinhalt zeigt ein viel rascheres Wachstum als seine primitive Basis, so dass diese bald bedeutend hinter dem cranialen Schädelende zurückbleibt.

Der Punkt *ms* nun bleibt keineswegs in allen späteren Stadien der Entwicklung des Embryo der Schädelbasis angelagert, er wächst, wie es Medianschnitte älterer Embryonen lehren, nach oben aus, buchtet sich als mittlerer Schädelbalken Rathkes (vorderer Schädelbalken Köllikers) tief in das Gehirn vor, zuerst als starke bindegewebige Leiste von einem Ast der arteria basilaris ernährt, so dass schliesslich *ms* beinahe in die Mitte des Gehirns zu liegen kommt. Später aber, zu der Zeit, wo das häutige Cranium seine Umwandlung in Knorpelgewebe beginnt, wird dieser Bindegewebsbalken atrophisch zu einer schwachen Leiste, aus der nach vollständiger Ausbildung des knorpeligen Schädels, wie schon Kölliker gelehrt hat, pia mater wird. Die definitive Sattel-

ne dagegen entwickelt sich „an der Basis des mittleren Gabelbalken Rathkes“ ohne jegliche Beziehung zu dem Punkte *ms.*

2. Der Hirnanhang entsteht in seinem lobus anterior einer Ausbuchtung der primitiven Mundhöhle und in seinem lobus posterior aus dem Centralnervensystem.

Kölliker bezeichnet in seiner Figur *h* als leichte Einengung des Ectoderms, aus welcher später die Hypophysis entsteht. Albrecht leugnet dies, indem er behauptet, dass die Hypophysis durchaus keine Beziehungen zum Gehirn oder der primitiven Mundhöhle besitze. Er stützt sich dabei wesentlich auf das schon oben erwähnte Zeugniß Rathke's.¹⁾ Allerdings hat dieser Forscher, umgestimmt durch die Arbeiten von Bourguery seine anfänglichen Ansichten aufgegeben, aber doch mit Unrecht.

Schon auf sehr einfachem Wege kann man sich von der Existenz der Rathke'schen Tasche überzeugen: man braucht nur einen Hühnerembryo von 3—5 Tagen oder einen Meisenembryo von 10—14 Tagen kurze Zeit in Alkohol zu legen, ihm dann den Unterkiefer ablösen und mit der Loupe die primitive Mundhöhle und den Rachen betrachten, dann wird man deutlich die Hypophysenbucht als mehr oder minder tiefe Einsenkung wahrnehmen.

Doch diese Beweisführung allein wird Herrn Albrecht nicht genügen. Die Medianschnitte von Embryonen verschiedenen Alters aber zeigen aufs Unzweideutigste, dass Rathke sich getäuscht hat und dass Albrecht sich durch Rathke hat täuschen lassen.

(¹) Rathke. Ueber die Entwicklung der Schildkröten. Braunschweig 1848 pag. 29.

Man kann beobachten, wie die Stelle *h* (der Kolliker'schen Figur) schon bei Embryonen von 10 und 11 Tagen zu einer grubenartigen Vertiefung wird, eine Veränderung, die grösstenteils passiv erzeugt wird durch das Auswachsen der Vorderhirnblase. Diese Grube wird bei Embryonen von 15 Tagen tiefer und schmaler, hängt aber immer noch mit der primitiven Mund- und Rachenhöhle zusammen. Bald darauf (bei Embryonen von 18 Tagen) hat sich diese Tasche vollständig abgeschnürt, und nur ein schmaler Streifen, der sich durch stärkere Färbung der Zellen von der Umgebung abhebt, zeigt ihren früheren Zusammenhang an. Der abgeschnürte Schlauch hat sich ausserdem S förmig gekrümmt. In der Nähe dieses Gebildes bemerkt man deutlich eine Ausstülpung der Gehirnhöhle, der process. infundibuliformis des Gehirns, der einen grossen Teil des Hypophysenschlauchs umfasst.

In späteren Embryonalstadien schliesslich, wo der knorpliche Schädel fast vollständig entwickelt ist, lässt sich konstatieren, dass diese abgeschnürte Rathke'sche Tasche sowie der process. infundibuliformis des Gehirns schalenförmig von dem Basalknorpel des Schädels umgeben wird und dass die Rathke'sche Tasche zum lob. anterior, der process. infundibuliformis zum lob. posterior der definitiven Hypophysis wird.

3. Der speno-ethmoidale Teil des Schädels hat keinen Zusammenhang mit dem vorderen Ende der Chorda dorsalis; er entsteht vor der Hypophysenbucht, während die Chorda hinter derselben verbleibt und er ist in der Kolliker'schen Figur noch gar nicht angedeutet. Da Albrecht *ms* als der Ort der definitiven Sattellehne betrachtet, so hält er die Strecke zwischen *ms* und *ch*, die in diesem frühen Embryonal-

um zwischen Sattellehne und dem cranialen Schädelende für den pheno-ethmoidalen Schädelabschnitt.

Hier hat derselbe falsche Grundgedanke Albrecht zu Fehlschluss verleitet; denn der Punkt *ch*, der in der bei einem Kaninchenembryo von 9 Tagen am cranialen delende liegt, bleibt bei Embryonen höheren Alters weiter dem cranialen Ende zurück.

Schon bei Embryonen von 10 und 11 Tagen bildet die ke *ms-ch* und mit ihr das vordere Ende der Chorda salis nur einen Teil der häutigen Schädelbasis, während in der Kölliker'schen Zeichnung noch den ganzen Basal- des heutigen Schädels durchzieht. Durch das Auswachsen des Gehirns bildet sich vor dem Punkte *ch*, resp. vor der ke *ms-ch*, die man vielleicht primitive Schädelbasis nennen te, ein neuer Basalteil, von der primitiven Basis durch Hypophysensäcken getrennt, in seiner ganzen Aus- gung also vor der Hypophysenbucht liegend. Dieser neu handene Basalteil zeigt aber in diesem Alter der Em- ryonen erst minimale Spuren einer Mesodermis in der glinie. Jedenfalls aber geht schon aus diesen Embryonal- en hervor, dass die Chorda dorsalis, welche sich deutlich in die Nähe von *ch* verfolgen lässt, hinter dem cranialen delende zurückbleibt. Sie ist von dem vordersten Basal- durch die Rathke'sche Tasche getrennt.

In späteren Stadien, Embryonen von 15 Tagen, findet in dem vor *ch* und der Hypophysenbucht liegenden eil des Schädels schon eine stark ausgeprägte Mesoderm- nt, welche wir als die Anlage des pheno-ethmoidalen des Schädels bezeichnen müssen. Dieser Teil liegt also er nun schon tief gewordenen Hypophysenbucht und

steht ohne jeglichen Zusammenhang mit dem vordersten Chordaende, das auch hier natürlich nicht über die Hypophysenbucht hinausreicht.

In den letzten Stadien ist der spheno-ethmoidale Teil noch deutlicher entwickelt, und eine Umwandlung in Knorpel in seinem grössten Teil vorhanden. Die Chorda dorsalis ist in ihrer ganzen Länge im Spheno-occipitalteil des Schädels zu konstatieren, dessen knorplicher Teil sich deutlich von der Umgebung abhebt. Sie zieht in ihrem untersten Teil am ventralen Rande des Knorpels entlang, gelangt dann mit mehreren kleinen Schlängelungen bis dicht an die definitive Sattellehne, um sich hier mit abgerundeter Knickung allmählich zu verlieren. Vor der definitiven Sattellehne und Sattelgrube befindet sich „auch nicht die Spur einer chordaähnlichen Bildung“, dagegen lagert der ganze Spheno-ethmoidalteil des Schädels vor derselben.

Eine metamere Gliederung des spheno-ethmoidalen Teils des Schädels lässt sich in keinem dieser Medianschnitte auch nur andeutungsweise erkennen. —

Nachdem wir durch diese Beobachtungen bewiesen haben, dass den Behauptungen Albrechts jede entwicklungs-geschichtliche Basis fehlt, wird es nicht schwer fallen, auf sein zweites Beweismittel, den Befund an dem Brüsseler Rinderschädel, vollständig zu entkräften. Es muss uns wunderbar erscheinen, wie Albrecht überhaupt die im Septum narium gefundenen „metameren“ Ossifikationsherde als Wirbelcentra bezeichnen konnte.

Abgesehen nun davon, dass da, wo die Chorda nicht vorhanden ist, auch keine Wirbelcentra sein können, sprechen noch andre positive Befunde für die Unhaltbarkeit dieser Behauptung.

Wenn man an den Medianschnitten von Schädeln älterer Thiere das Auftreten und das Fortschreiten der Verknöcherungen im knorplichen Septum verfolgt, so wird man leicht erkennen, dass die Verknöcherungsherde regellos im knorplichen Septum verstreut sind und zu kleineren und grösseren Herden confluieren. Wenn sie nun im Bereich des Nasenkammes zu ossificierten Auftreibungen sich umgewandelt haben, so kann man dies nur den verschiedenen Ernährungsverhältnissen zuschreiben, unter denen dieser Strang gegenüber den andern Theilen des Septum narium steht. Die caudo-craniale Richtung der scheinbaren Metamerie ist in diesem Fall rein zufällig, weil sie an den Verlauf des Nasenkammes gebunden sind. Diese Ossifikationen sind eben, wie schon Neuner gezeigt hat, Produkte des senilen Verknöcherungsprozesses.

Aber was ist denn eigentlich dieser Nasenkamm, in welchem Albrecht das vordere Chordaende gefunden haben wollte? Es wird mir hoffentlich gelingen, seine Bedeutung zu erklären, indem ich ihn unter eine Gruppe analoger Bildungen in der Nasenhöhle mehrerer Tierspecies einreihe, indem ich ferner die Veränderungen andeute, denen jene Bildungen in den verschiedenen Entwicklungsstadien der Tiere unterworfen sind, und indem ich schliesslich die Funktion derselben, durch welche sie für den Organismus nützlich sind.

Schon bei Rindsembryonen fand ich im Septum narium Bildungen, welche als dem Nasenkamm analog zu betrachten sind.

Während nämlich der Nasenkamm in der Längsrichtung des Septums verläuft und genau dem Verlauf des mittleren Nasenganges entspricht, finden wir im hintersten Bereich des Septum narium, im Bereich der Lamina perpendicularis ossis ethmoidalis ähnliche, nur viel weniger ausgeprägte Schleimhautleisten, welche genau den Zwischenräumen entsprechen, welche die hinteren Ethmoidalmuscheln zwischen sich lassen.

Auch auf Durchschnitten des Septums, welche senkrecht zur Längsaxe der Wülste gelegt worden sind, zeigen sie makroskopisch viel Aehnlichkeiten. Alle sind wesentlich bedingt durch Verdickungen der Submucosa, aber auch der Knorpel des Sept. nar. beteiligt sich durch eine deutlich wahrnehmbare Verdickung an der Bildung der Mehrzahl dieser Leisten.

An älteren Embryonen fällt noch ein anderer Wulst auf, der sich längs des unteren Randes des Septums hinzieht und von einigen Autoren als Centrum venosum Schwabii beschrieben wurde. Er zeigt eine starke Blutfüllung und füllt einen grossen Teil des Raumes aus, der zwischen den medialen Rändern der unteren Muschel und dem Boden der Nasenhöhle sich befindet.

Im extrauterinen Leben haben diese eben beschriebenen Leisten nur zum Teil gleichen Schritt gehalten mit der Entwicklung des Organismus. Der Nasenkamm und das Centr. venos. Schwab. haben entsprechend an Mächtigkeit zugenommen, das letztere zeigt allerdings meist eine geringere Blutfülle. Die Wülste dagegen, welche im Bereich der hintern Siebbeinmuscheln bei Embryonen deutlich zu konstatieren waren, sind zum Teil schwächer ausgeprägt, zum Teil ganz verschwunden. Eine besonders starke Entwicklung zeigte aber in diesem Stadium noch ein anderer Wulst, im Bereich des untern Nasenganges liegend. Er trägt sogar einen Knorpel als Grundlage, der vom Ansatzknorpel der unteren Muschel entspringt. Auch er besteht aus lockerem Gewebe, das im frischen Zustand reichlich mit Blut gefüllt ist.

Bei einem erwachsenen Rinde im Alter von ungefähr 8 Jahren waren nur unwesentliche Veränderungen eingetreten. Die Nasenschleimhaut ist im Allgemeinen etwas weniger blutreich als bei jungen Tieren. Die hinteren Ethmoidalleisten sind kaum noch angedeutet. Dagegen ist der Nasenkamm

einem mächtigen Wulst geworden. Auf dem Querschnitt ist deutlich ein Knorpelstrang zu sehen, der aber in seiner ganzen Länge vom knorpeligen Septum getrennt ist. Den übrigen Teil des Kammes füllt, wie die mikroskopische Untersuchung ergibt, lockeres Bindegewebe und eine grosse Anzahl acinöser Drüsen aus.

Auch bei andern Tieren sind ähnliche Hervorragungen der Nasenschleimhaut im Bereich des Sept. nar. aufzufinden, die unzweifelhaft als den beim Rind aufgefundenen analogen zu betrachten sind. Sie sind von wechselnder Stärke, je nachdem es die Verhältnisse der lateralen Nasenhöhlenwand anstellen. Bei denjenigen Tieren werden sie natürlich ganz fehlen, wo die lateralen Nasenhöhlenwandungen keinen Raum zwischen sich lassen, in welche das Septum mit diesen leistenartigen Verdickungen eindringen könnte. So z. B. konnte ich keine derartigen Bildungen bei Katzen und Kaninchen konstatieren.

Dagegen bemerkte man am Septum der Maus, sowohl im intrauterinen als auch im extrauterinen Leben (bei der lebenden Maus allerdings in geringerer Stärke) zwei in der Längsrichtung des Septums verlaufende Leisten, eine obere, in der Lage nach dem Nasenkamm des Rindes entsprechend, und eine untere, dem centr. venos. Schwab. entsprechend, und ebenfalls wie diese durch Blutreichtum ausgezeichnet.

Ähnliche Verhältnisse liessen Querschnitte von Schweins-Embryonen und erwachsenen Tieren erkennen. Der obere Nasenwulst des Sept. war im Verlauf des mittleren Nasenganges und der untere im unteren Nasengange. Auch im Bereich der Lamin. perpendic. oss. ethmoid. zeigten Embryonen schwache Schleimhautverdickungen.

Schliesslich sind auch beim Menschen ähnliche Bildungen schon seit langer Zeit bekannt. Von Morgagni¹⁾ zuerst beschrieben und später von Zuckerkandl²⁾ hervorgehoben, besteht ein Wulst „am Eingang in die Riechspalte, zwischen den vorderen Enden der mittleren Nasenmuscheln“ der wesentlich durch Anhäufung von Drüsen gebildet wird. Auch das knorpliche Septum ist hierbei durch lokale Verdickung beteiligt.

Bei allen diesen Beobachtungen fiel die Thatsache auf, dass die erwähnten Unebenheiten des Septums im Embryonalleben der Tiere verhältnissmässig am stärksten entwickelt waren. Es kann mit Sicherheit behauptet werden, dass sie beim Embryo das Enganeinanderliegen der Wände der Nasenhöhle begünstigen, derart, dass zwischen ihnen hindurch nichts aus dem die Frucht umhüllenden Raum in den hinteren Teil des Cavum narium gelangen kann.

Vielleicht haben sie im Embryonalleben den Zweck, durch diesen Verschluss für die dahinter gelegenen Teile der Nasenhöhlenschleimhaut und insbesondere für die regio olfactoria einen Schutzapparat gegen äussere Insulte darzubieten.

Wichtiger noch erscheint mir die Funktion, die diese Schleimhauterhebungen im extrauterinen Leben haben.

Wir müssen sie unterordnen unter die grosse Anzahl von Kanten und Vorsprüngen, welche die Nasenhöhle besitzt, um die Aufgabe zu erfüllen, welche sie für den Organismus leisten soll, und deren wichtigsten Vertreter die Muscheln sind.

Denn nicht bei allen Tieren genügen die Muscheln, um den einen Zweck der Nasenhöhle zu erreichen, nämlich eine möglichst gleichmässige Passage in den Nasengängen zu

1) Morgagni, Adv. anatom. omn. Lugd. Batav. 1723.

2) Normale und pathol. Anatomie der Nasenhöhle. Wien 1892. Wilh. Braumüller. Pag. 53 u. Taf. III, Fig. 11b.

elen. Unsere oben beschriebenen Bildungen können dann zweifache Weise diese Funktion der Muscheln unterstützen.

1. Indem sie mechanisch durch ihre Vorwölbung in das Innere der Nasenhöhle hinein raumverengernd wirken,

2. indem sie teilweise durch ihren Drüsenreichtum, teilweise durch ihren Blutreichtum den passierenden Luftstrom feucht machen und erwärmen können.

So wird das centr. venos. Schwab. der Rinder den Nasengang nicht unwesentlich verengern können, es wird ihn sogar mehr oder weniger stark verändern können, nachdem es der Vorteil des Tieres erfordert, da natürlich die stärkere Füllung seiner reichlichen Gefässe sein Volumen vergrössern kann.

Der Nasenkamm wird aber noch einer andern Funktion fähig sein können, er bildet die Grenze zwischen der Reg. exterior und respiratoria und erscheint als Schutzwall der sehr empfindlichen Riechosphäre gegen ihre Feinde, indem nur wohldurchwärmte und wohldurchfeuchtete Luft in die für ihm liegenden Teile des cavum narium gelangen lässt. Es ist sogar anzunehmen, dass grade durch diese Hervorhebungen im Verein mit dem eigentümlichen cavernösen Aufbau einzelner Teile der Submucosa dem Organismus die Möglichkeit gegeben ist, die Nasengänge, ähnlich wie im Embryonalstadium ganz zu verschliessen, wenn es das Interesse verlangt.

Natürlich müssen wir, wenn wir diese Bildungen als „Muscheln“ bezeichnen, den Begriff „Muschel“ im weitesten Sinne des Wortes gebrauchen, und nicht nur das als Muschel fassen, was die von Gegenbauer beschriebenen „fundamentalen Eigenschaften einer Muschel“ besitzt, indem nämlich der Autor „an den Begriff einer Muschel die Vorstellung

einer einfachen, frei in die Nasenhöhle ragenden Lamelle knüpft“. Sicher aber haben die von uns beschriebenen Septalleisten funktionell die Eigenschaften einer Muschel.

Herr Professor Dr. Hasse gab mir die Anregung zu dieser meiner Erstlingsarbeit und stellte mir mit der grössten Liberalität die Hilfsmittel des hiesigen anatomischen Instituts zur Verfügung. Für diese Anregung sowohl, als auch für die Beihilfe, die mir bei allen Untersuchungen Herr Prosector Professor Dr. Born gewährt hat, erlaube ich mir an dieser Stelle öffentlich meinen wärmsten Dank auszusprechen.

Vita.

Verfasser, evangelischer Confession, Sohn des verstorbenen Kaufmanns Eduard Paulisch zu Reichthal, wurde am 22. Januar 1863 ebendasselbst geboren. Bis Ostern 1873 besuchte er die evangelische Elementarschule zu Reichthal, von Ostern 1873 bis Ostern 1874 die höhere Bürgerschule zu Namslau. Dann trat er in die Sexta des Gymnasiums zu Oels ein, welches Gymnasium er Ostern 1883 mit dem Zeugniß der Reife verliess. Am 21. April 1883 wurde er bei der hiesigen medicinischen Fakultät immatrikuliert. Vom 1. April bis zum 30. September desselben Jahres genügte er seiner halbjährigen Dienstpflicht unter der Waffe bei der 2. Kompagnie 4. Nieder-Schles. Infanterie-Regiments No. 51. Am 26. Februar 1885 absolvierte er das Tentamen physicum. Im Wintersemester 1885/86 war er als Unterassistent in der Königl. chirurg. Klinik thätig. Am 14. Juli 1887 bestand er das Examen rigorosum.

Während seiner Studienzeit besuchte er die Vorlesungen, Kliniken und praktischen Kurse folgender Herren Professoren und Docenten:

Biermer, Born, F. Cohn, H. Cohn, Filehne, Fischer, Förster, Fränkel, Fritsch, Gscheidlen, Gierke†, Hasse, Heidenhain, Hirt, Löwig, Magnus, Meyer, Neisser, Partsch, Ponfick, Richter, Röhmann, Rosenbach, Roux, Soltmann, Unverricht, Wiener.

Allen diesen seinen hochverehrten Lehrern sagt Verfasser an dieser Stelle seinen wärmsten Dank.

Thesen.

1. Die Chorda dorsalis reicht nach vollständiger Ausbildung des Schädels der Wirbeltiere nie über die definitive Sattel lehne hinaus.
2. Der Arzt ist in jedem Fall berechtigt, die Nachgeburtsperiode abzukürzen.
3. Die Wirkung des Morphinum ist eine rein centrale, es greift direkt die Ganglienzellen des Gehirns und des Rückenmarks an.